

Skala punktowa do rozpoznawania autoimmunologicznego zapalenia wątroby na podstawie wytycznych Międzynarodowej Grupy AZW

Na podstawie: Alvarez F., Berg P., Bianchi F. i wsp.: *International Autoimmune Hepatitis Group Report: review of criteria for diagnosis of autoimmune hepatitis. J. Hepatol., 1999, 31, 929.*

Analizowany parametr	Punkty	Analizowany parametr	Punkty
Płeć żeńska	+2	Inne ch. autoimmunologiczne	+2
Stosunek ALP:AST lub ALT		Spożycie alkoholu:	
<1,5	+2	< 25 g/dobę	+2
1,5-3,0	0	> 60 g/dobę	-2
>3,0	-2		
ANA, SMA lub LKM-1		Histopatologia wątroby	
>1:80	+3	zapalenie okołowrotne	+3
1:80	+2	naciek limfocytarno-plazmat.	+1
1:40	+1	rozety z kom. wątrobowych	+1
<1:40	0	żadne z powyższych	-5
Obecność AMA	-4	zmiany dróg żółciowych	-3
		zmiany sugerujące inną chorobę	-3
Wielokrotność normy stęż. globulin lub IgG:		Parametry dodatkowe *	
>2,0	+3	występowanie innych auto- ciał**	+2
1,5-2,0	+2	HLA DR3 lub DR4	+1
1,0-1,5	+1		
<1,0	0		
Przyjmowanie leków hepatotoksycznych:		Odpowiedź na leczenie:	
obecne	-4	całkowite	+2
nieobecne	+1	nawrót choroby	+3
Serologiczne markery WZW:			
obecne	-3		
nieobecne	+3		
Rozpoznanie AZW w oparciu o sumę punktów:			
	przed leczeniem		po leczeniu
pewne	>15		>17
prawdopodobne	10-15		12-17

* - mogą być brane pod uwagę tylko u pacjentów ANA, SMA i LKM-1 negatywnych,

** - pANCA, anty-LC1, anty-SLA, anty-ASGPR, anty-LP